

臺北榮總兒童外科 **肛門瘻管、肛裂、會陰部** 手術後注意事項

- 【1】 手術後一兩天內可能會有輕微發燒的現象，此為正常現象，可按照醫囑服用止痛解熱藥水（如：安佳熱[®]糖漿、舒抑痛[®]糖漿）。但若發燒超過 39 度或持續發燒超過三天，請與醫師連絡或至門診追蹤。
- 【2】 手術後可先喝少量溫水，若觀察 30 分鐘內無嘔吐現象，則可正常進食；若稍有嘔吐現象則先禁食 2-4 小時後再次嘗試溫水及進食。剛開始進食請採少量多餐原則，以免造成腹脹不適。
- 【3】 返家以後可將敷料移除，傷口不需特別包紮，為減輕手術後腫脹以及避免感染，應在如廁之後沖水清潔傷口並浸泡溫水。浸泡溫水以每日三次為原則，每次約 10-15 分鐘，水溫約 37-40 度不可過熱，水中可依照醫囑加入些許水溶性優碘藥水。泡完水用紗布或乾淨毛巾擦乾後，可依照醫囑塗上抗生素軟膏術。
- 【4】 請按時回診追蹤，若返家後有任何異常現象之疑慮請盡速與醫師聯絡。

★兒童外科門診時間（湖畔門診 3 樓 6 診）：每週二、週四下午 13:30 至 17:00
隔週週五晚間 18:00 至 21:00
每週六上午 08:30 至 12:00

★兒童外科連絡電話（請於上班時間來電）：

兒童外科辦公室(中正樓 10 樓 103 病房旁) ☎:02-28757484 或 28712121 轉 2101
中正樓 3 樓手術室護理站 ☎:02-28757036 轉 9

臺北榮民總醫院兒童外科敬啟



制定日期： 93 年 6 月
第一次修訂：99 年 9 月
第二次修訂：104 年 8 月