

臺北榮總兒童外科 **膀胱鏡檢查、輸尿管導管置入、抗逆流逆福仕**

手術後注意事項

- 【1】 手術後一兩天內可能會有輕微發燒的現象，此為正常現象，可按照醫囑服用止痛解熱藥水（如：安佳熱[®]糖漿、舒抑痛[®]糖漿）。但若發燒超過 39 度或持續發燒超過三天，請與醫師連絡或至門診追蹤。
- 【2】 手術後可先喝少量溫水，若觀察 30 分鐘內無嘔吐現象，則可正常進食；若稍有嘔吐現象則先禁食 2-4 小時後再次嘗試溫水及進食。剛開始進食請採少量多餐原則，以免造成腹脹不適。
- 【3】 疼痛：因為手術內視鏡器械從尿道口進出，尿道口可能會有輕微疼痛的狀況，可按照醫囑服用止痛解熱藥水（如：安佳熱[®]糖漿、舒抑痛[®]糖漿）。
- 【4】 血尿：因為手術內視鏡器械從尿道口進出，可能會有短暫的時間尿液會呈現淡粉紅色，請多為孩子補充水分會逐漸改善。若發現尿液中有鮮血或者膀胱脹但無法排尿的狀況請與醫師聯絡或至急診室。
- 【5】 返家後可能會開立抗生素，請依照醫囑服用。
- 【6】 請多為孩子補充水分，並鼓勵孩子按時如廁避免憋尿，以免產生尿路感染。
- 【7】 請按時回診追蹤，若返家後有任何異常現象之疑慮請盡速與醫師聯絡。

★兒童外科門診時間（湖畔門診 3 樓 6 診）：每週二、週四下午 13:30 至 17:00
隔週週五晚間 18:00 至 21:00
每週六上午 08:30 至 12:00

★兒童外科連絡電話（請於上班時間來電）：

兒童外科辦公室(中正樓 10 樓 103 病房旁) ☎:02-28757484 或 28712121 轉 2101
中正樓 3 樓手術室護理站 ☎:02-28757036 轉 9

臺北榮民總醫院兒童外科敬啟



制定日期： 93 年 6 月
第一次修訂：99 年 9 月
第二次修訂：104 年 8 月