



臺北榮總兒童外科 **甲溝炎** 手術後注意事項

- 【1】 手術後一兩天內可能會有輕微發燒的現象，此為正常現象，可按照醫囑服用止痛解熱藥水（如：安佳熱[®]糖漿、舒抑痛[®]糖漿）。但若發燒超過39度或持續發燒超過三天，請與醫師連絡或至門診追蹤。
- 【2】 進食：
 - 甲、 手術若採局部麻醉，手術後即可進食。
 - 乙、 手術若採全身麻醉，手術後可先喝少量溫水，若觀察30分鐘內無嘔吐現象，則可正常進食；若稍有嘔吐現象則先禁食2-4小時後再次嘗試溫水及進食。剛開始進食請採少量多餐原則，以免造成腹脹不適。
- 【3】 疼痛：麻醉藥退去後可按照醫囑服用止痛藥水（如：安佳熱[®]糖漿、舒抑痛[®]糖漿）以緩解疼痛術。
- 【4】 敷料：紗布可能和裸露出的甲床黏住，若無法分離請勿硬拉，可以用生理食鹽水沾濕紗布再慢慢分離，或者將患部浸泡在溫水中再慢慢將紗布拉開。有時紗布拉開後會有輕微滲血的狀況，通常不嚴重，以紗布徒手加壓十分鐘即可止血，但若發現流血不止請至急診室。
- 【5】 返家後可能會開立抗生素，請依照醫囑服用。
- 【6】 手術後依照醫囑每天以溫水加入些許水溶性優碘浸泡傷口。
- 【7】 手術後依照醫囑用水溶性優碘、生理食鹽水清潔後，塗上抗生素軟膏，若要避免摩擦可覆蓋紗布。

★兒童外科門診時間（湖畔門診3樓6診）：每週二、週四下午13:30至17:00
隔週週五晚間18:00至21:00
每週六上午08:30至12:00

★兒童外科連絡電話（請於上班時間來電）：

兒童外科辦公室(中正樓10樓103病房旁) ☎:02-28757484 或 28712121 轉 2101
中正樓3樓手術室護理站 ☎:02-28757036 轉 9

臺北榮民總醫院兒童外科敬啟



制定日期： 93年6月
第一次修訂：99年9月
第二次修訂：104年8月