

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
108年第4期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Ultracet® tab	止痛/Opioid,	Ursolic® tab 100 mg	溶解膽結石/Gallstone
(Tramadol 37.5 mg + Acetaminophen 325 mg)	acetaminophen	(Ursodeoxycholic acid)	dissolution agent
Avastin® inj 25 mg/ml (Bevacizumab)	標靶治療 /VEGF inhibitor	Anesvan® inj 10 mg/ml (Propofol)	鎮靜、麻醉 /General anesthetic

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Oxycodone	止痛 /Opioid analgesic	OxyContin® CR tab 10 mg OxyContin® CR tab 20 mg OxyNorm® IR cap 5 mg
Methylphenidate	改善注意力、治療嗜睡症 /CNS stimulant	Concerta® ER tab 18 mg Concerta® ER tab 27 mg Ritalin® tab 10 mg Ritalin® LA tab 20 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Gaslan® tab 40 mg 消除脹氣	Mag. oxide® tab 250 mg 軟便、緩瀉、制酸 (胃藥)	白色、圓形、大小相近
Genvoya® FC tab 抗病毒	Odefsey® FC tab 抗病毒	橢圓形、標記 GSI、大小相近

4. 實例說明

案例 1 處方：Invanz® inj 1g (Ertapenem) IVA QD 配製於 Dextrose inj 50 % 500 ml/bot 治療泌尿道感染。

建議：將輸液 Dextrose inj 50 % 500 ml/bot 改為 Normal saline inj 0.9 % 500 ml/bot。

說明：Invanz® inj 不可使用含葡萄糖的稀釋液。

案例 2 處方：Stilnox® CR tab 6.25 mg (Zolpidem) 1 tab NGT HS 治療失眠。

建議：將 Stilnox® CR 改以非特殊劑型的 Stilnox® FC tab 10 mg (Zolpidem) 1 tab NGT HS 紿藥。

說明：Stilnox® CR tab 為持續性藥效錠，不建議磨粉管灌給藥。