

Paxlovid (倍拉維) 腎功能不全患者之用法用量說明

腎功能不全	eGFR (mL/min)	建議劑量	第1天 → 第2天 → 第3天 → 第4天 → 第5天
輕度	≥ 60 至 < 90	無需調整劑量	<p>無需調整劑量</p> <p>☀️ 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1#</p> <p>🌙 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1#</p>
中度	≥ 30 至 < 60	1#/1# BID x 5 天	<p>中度腎功能不全</p> <p>☀️ 1# 1# 1# 1# 1#</p> <p>🌙 1# 1# 1# 1# 1#</p>
重度 包括需要血液透析 的腎功能不全	< 30	<p>Day 1: 2# nirmatrelvir 1# ritonavir once</p> <p>Day 2- Day 5: 1# nirmatrelvir 1# ritonavir QD</p>	<p>重度腎功能不全 (一天服用一次，劑量如下)</p> <p>☀️ 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1#</p> <p>🌙 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1# 1#</p> <p>● Nirmatrelvir ○ Ritonavir</p>

- 重度腎功能不全應大約在每天同一時間施用，持續 5 天。
- 在血液透析的日子，應在血液透析後施用。