



### 一、本藥用途為何？

配西汀 (pethidine) 屬類鴉片製劑，具高度成癮性，在臺灣列為第二級管制藥品。核可用於治療麻醉手術後顫抖、藥品或輸血引起冷顫、因特殊原因（如：過敏）無法使用其他所有類鴉片藥品之中重度疼痛。

※本藥不建議第一線用於急慢性止痛。

### 二、如何使用本藥？

正常成人常用劑量為單次 50~100 毫克 (1~2 支)，並由受過訓練之專業醫療人員進行肌肉注射或皮下注射。24 小時內注射總量不得超過 600 毫克，且使用期間不應超過 48 小時。

### 三、可能副作用與注意事項：

1. 常見副作用：眩暈、鎮靜、欣快、精神激昂、暫時性幻覺及定向力缺失、噁心、嘔吐、流汗、尿滯留、口乾、便秘、注射處疼痛等。  
罕見副作用：可能發生呼吸抑制、休克及心跳停止等危象。
2. 成癮性：配西汀連續使用可能蓄積於體內，誘發肌肉痙攣、焦慮、發抖或癲癇等中樞性副作用，使用後會產生欣快感，若不當使用易造成心理、生理上之依賴及成癮。
3. 正在服用單胺氧化酶抑制劑（一種抗憂鬱劑）或是過去 14 天內曾服用者，禁用此藥品。因為併用兩藥可能造成高血壓危象、體溫過高和心血管系統失能，並可能造成死亡。
4. 本藥品不建議用於下列病人：
  - (1) 急性氣喘發作或罹患呼吸阻塞性肺病、心律不整、嗜鉻細胞瘤者。
  - (2) 非癌症慢性頑固性疼痛或癌症病人之急性疼痛發作。
  - (3) 肝、腎或膽道功能不良者。
  - (4) 頭部外傷、顱內病灶或顱內壓增高者。
5. 請遵照醫囑用藥，切勿自行調整劑量；若藥品須換藥或減量時，請依醫師指示緩慢並循序漸進的減量，勿擅自停止或調高劑量。
6. 本藥品屬第二級管制藥品，限供醫藥及科學上之需用，倘非法販賣、持有、施打者，將依毒品危害防制條例移送法辦。

緊急用藥諮詢專線：(02)2875-7289

服務時間：週一至週五 0800-1730

本單僅供參考，無法詳載全部資料，若有疑問請諮詢醫師或藥師。