

臺北榮民總醫院口服特殊劑型給藥說明

藥學部 97 年 6 月初版

115 年 1 月更新

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
1.	Acamprosate calcium "X" DR tab 333 mg (Acamprosate calcium)	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
2.	Aceo retard cap 90 mg (Acemetacin retard) 痛立安 長效膠囊 30 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
3.	Adalat OROS * tab 30 mg (Nifedipine) 冠達悅歐樂 持續性藥效錠 30 毫克 (尼菲迪平)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
4.	Advagraf PR * cap 1 mg (Tacrolimus) 安瑞福 持續性藥效膠囊 1 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
5.	Afinitor * tab 5 mg (Everolimus) 癌伏妥 錠 5 毫克	應整粒吞服，不可嚼碎。無法吞服者請將藥錠溶於水，攪拌至崩散後立即服用，再以水沖洗杯內餘藥喝下。
6.	Aggrenox MR cap (Dipyridamole 200 mg + Aspirin 25 mg) 腦康平 持續性藥效膠囊 (複方)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
7.	Alecensa cap 150 mg (Alectinib) 安立適 膠囊 150 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
8.	Alglutol DR tab 333 mg (Acamprosate calcium) 戒酒妥 腸溶錠 333 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
9.	Alunbrig FC # tab 30 mg (Brigatinib) 癌能畢 膜衣錠 30 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
10.	Alunbrig FC # tab 180 mg (Brigatinib) 癌能畢 膜衣錠 180 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
11.	Alunbrig "X" FC * tab 30 mg (Brigatinib)	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
12.	ALUNBRIG "X" FC * TAB 180 MG (Brigatinib)	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
13.	Andriol testocaps cap 40 mg (Testosterone undecanoate) 恩賜特 膠囊 40 毫克 (睪丸素)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
14.	Ansures ER #* tab 500 mg (Metformin) 安胰敏 緩釋錠 500 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
15.	Aquipta tab 60 mg (Atogepant) 艾妥達 錠 60 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
16.	Asacol tab 400 mg (Mesalazine) 阿腸克 錠 400 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
17.	Asacol gastro-resistant * tab 800 mg (Mesalazine,5-ASA) 阿腸克 錠 800 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
18.	Aspirin protect * tab 100 mg (Aspirin) 阿斯匹林 腸溶膜衣錠 100 毫克 (阿斯匹林、乙醯水楊酸)	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
19.	Atozet FC tab 10/20 mg (Ezetimibe + Atorvastatin) 優泰脂 膜衣錠 10/20 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
20.	Balversa FC * tab 3 mg (Erdafitinib) 盼樂 膜衣錠 3 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
21.	BALVERSA FC * TAB 4 MG (ERDAFITINIB) 盼樂 膜衣錠 4 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
22.	Bensau soft cap 100 mg (Benzonatate) 剎咳得 軟膠囊 100 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
23.	Betaloc ZOK * tab 25 mg (Metoprolol) 舒壓寧 控釋錠 25 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
24.	Betaloc ZOK tab 100 mg (Metoprolol) 舒壓寧 控釋錠 100 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
25.	Betmiga PR tab 25 mg (Mirabegron) 貝坦利 持續性藥效錠 25 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
26.	Betmiga PR tab 50 mg (Mirabegron) 貝坦利 持續性藥效錠 50 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
27.	Bezalip retard coated *tab 400 mg (Bezafibrate) 倍利脂 緩釋錠 400 毫克	本藥為持續釋放型膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
28.	Bisacodyl EC tab 5 mg VPP (Diphenylmethane) 秘克的 腸溶糖衣錠 5 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
29.	Bokey EM * cap 100 mg (Aspirin) 伯基 腸溶微粒膠囊 100 毫克 (阿斯匹林、乙醯水楊酸)	本藥為腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
30.	Braftovi hard cap 75 mg (Encorafenib) 迫癌癒 膠囊 75 毫克	本藥應整粒吞服。
31.	Briviact FC tab 100 mg (Brivaracetam) 必治癲 膜衣錠 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
32.	Broen-C EC tab (Bromelain 20000 u + L-Cysteine)	本藥為腸溶錠，可剝半但不可嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	20 mg) 撲炎喜 腸溶錠 (複方)	
33.	Brukinsa cap 80 mg (Zanubrutinib)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
34.	Buprotin SR FC * tab 150 mg (Bupropion HCl) 慮舒妥 持續性藥效膜衣錠 150 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
35.	Buprotin "SMK" SR FC * tab 150 mg (Bupropion HCl) 慮舒妥 持續性藥效膜衣錠 150 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
36.	Cabometyx FC tab 20 mg (Cabozantinib) 癌必定 膜衣錠 20 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
37.	Cabometyx FC tab 40 mg (Cabozantinib) 癌必定 膜衣錠 40 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
38.	Cabometyx FC tab 60 mg (Cabozantinib) 癌必定 膜衣錠 60 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
39.	Calquence cap 100 mg (Acalabrutinib) 克瘤康 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
40.	Calquence FC * tab 100 mg (Acalabrutinib) 克瘤康 膜衣錠 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
41.	Camzyos * cap 2.5 mg (Mavacamten)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
42.	Camzyos * cap 5 mg (Mavacamten)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
43.	Camzyos * cap 10 mg (Mavacamten)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
44.	Camzyos * cap 15 mg (Mavacamten)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
45.	Carbaglu dispersible tab 200 mg (Carglumic acid)	本藥為可溶錠，應溶於適量冷開水後服用，不可直接整粒吞服。本藥可剝半，但不可嚼碎或磨碎。
46.	Carbaglu dispersible tab 200 mg (5's) (Carglumic acid) 卡顧安素 可溶錠 200 毫克	本藥為可溶錠，應溶於適量冷開水後服用，不可直接整粒吞服。本藥可剝半，但不可嚼碎或磨碎。
47.	Cardizem retard tab 90 mg (Diltiazem) 凱帝心 徐放錠 90 毫克 (迪太贊)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
48.	Cellcept * cap 250 mg (Mycophenolate) 山喜多 膠囊 250 毫克	本膠囊應整粒吞服，不可打開或嚼碎服用。
49.	Ceretal SC * tab 400 mg (Pentoxifylline) 血利 持續性糖衣錠 400 毫克 (配妥西菲林)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
50.	Certican tab 0.5 mg (Everolimus) 卓定康 錠 0.5 毫克	本藥可剝半但不可嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
51.	Cialis FC tab 5 mg (Tadalafil) 犀利士 膜衣錠 5 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半。
52.	Cibinqo FC tab 200 mg (Abrocitinib) 喜績果 膜衣錠 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
53.	Clarinase repetabs * tab (Loratadine 5 mg + Pseudoephedrine 120 mg) 康瑞斯 持續藥效錠 (複方)	本藥為持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
54.	Chloraminophere #* cap 2 mg (Chlorambucil)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。避免直接接觸膠囊內藥粉。
55.	Concerta ER >* tab 18 mg (Methylphenidate) 專思達 長效錠 18 毫克 (派醋甲酯)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
56.	Concerta ER >* tab 27 mg (Methylphenidate) 專思達 長效錠 27 毫克 (派醋甲酯)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
57.	Const-K ER tab 750 mg (Potassium Chloride 10 mEq) 康是鉀 持續性藥效錠 750 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
58.	Coracten * cap 20 mg "SKF" (Nifedipine) 心克疼 持續膠囊 20 毫克 (尼菲迪平)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
59.	Cortiment MMX PR tab 9 mg (Budesonide) 可帝敏 持續性釋放錠 9 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
60.	Cresemba cap 100 mg (Isavuconazole) 驅黴霸 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
61.	C.T.L. XR #* tab 500 mg (Metformin) 驅糖樂 持續錠 500 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
62.	Cymbalta cap 30 mg (Duloxetine) 千憂解 膠囊 30 毫克	本藥為腸溶膜衣劑型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
63.	Cymbalta cap 60 mg (Duloxetine) 千憂解 膠囊 60 毫克	本藥為腸溶膜衣劑型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
64.	Danzen tab 5 mg (Serratiopeptidase) 達先 錠 5 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
65.	Delcopan SR FC * tab 60 mg (Dextromethorphan) 抑咳平 持續性膜衣錠 60 毫克 (右旋美索芬)	本藥為持續釋放型膜衣錠，可剝半但不可嚼碎。
66.	Delibs FC tab 50 mg (Pinaverium) 免腸躁 膜衣錠 50 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
67.	Depakine chrono FC tab 500 mg (Valproate sodium)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎也不可溶於水中。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	帝拔癩 持續性藥效膜衣錠 500 毫克	
68.	Depakine EC tab 200 mg (Valproate sodium) 帝拔癩 腸溶錠 200 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
69.	Detantol R FC tab 3 mg (Bunazosin HCl) 迪坦妥 持續性藥效膜衣錠 3 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
70.	Detrusitol SR * cap 4 mg (Tolterodine tartrate) 得舒妥 持續性藥效膠囊 4 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
71.	Dexilant DR cap 60 mg (Dexlansoprazole) 得喜胃通 緩釋膠囊 60 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
72.	Diabetrol SR tab 10 mg (Glipizide) 糖舒平 長效錠 10 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
73.	Diacomit hard cap 250 mg (Stiripentol)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
74.	Diacomit hard cap 250 mg (Stiripentol) 戴克癩 膠囊 250 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
75.	Diamicron MR #* tab 30 mg (Gliclazide) 岱蜜克龍 持續性藥效錠 30 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
76.	Diamicron MR #* tab 60 mg (Gliclazide) 岱蜜克龍 持續性藥效錠 60 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
77.	Doxaben XL tab 4 mg (Doxazosin) 可迅持續性藥效錠 4 毫克 (多薩坐辛)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
78.	Durotine * cap 30 mg (Duloxetine) 杜憂停 膠囊 30 毫克	本藥為腸溶膜衣劑型，應整粒吞服，不可打開膠囊、咀嚼或壓碎。
79.	Efexor XR SR cap 37.5 mg (Venlafaxine) 速悅 持續性藥效膠囊 37.5 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎。
80.	Efexor XR * cap 75 mg (Venlafaxine) 速悅 持續性藥效膠囊 75 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎。
81.	Erleada FC tab 60 mg (Apalutamide) 安列康 膜衣錠 60 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
82.	Eric SR * tab 600 mg (Etodolac) 艾雷克 持續性藥效錠 600 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
83.	Espin EM * cap 100 mg (Aspirin) 安心平 腸溶微粒膠囊 100 毫克 (阿斯匹林、乙醯水楊酸)	本藥為腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
84.	Exforge FC tab 5/160 mg (Amlodipine 5 mg +Valsartan 160 mg) 易安穩 膜衣錠 5/160 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
85.	Exjade dispersible tab 125 mg (Deferasirox) 易解鐵 可溶錠 125 毫克	本藥為可溶錠，應溶於適量冷開水後服用，不可整粒吞服、嚼碎或磨碎。
86.	Farydak # cap 10 mg (Panobinostat) 髓力達 膠囊 10 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
87.	Fedil SR * tab 5 mg (Felodipine) 順壓樂 持續釋放錠 5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
88.	Felopine ER FC * tab 5 mg (Felodipine) 紛落 持續釋放膜衣錠 5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
89.	Felpin ER FC * tab 5 mg (Felodipine) 菲可平 持續釋放膜衣錠 5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
90.	Fentora buccal #> tab 100 mcg (Fentanyl) 吩妥拉 口頰錠 100 微公克 (吩坦尼)	本藥為口頰錠，應整顆置於臉頰和牙齦之間，或置於舌下，不可切割、磨碎、咀嚼或整顆吞服。
91.	Finska-LP 24h SR FC tab (Loratadine 10 mg + Pseudoephedrine 240 mg) 柔他益 24 小時持續性膜衣錠 (複方)	本藥為持續釋放型膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
92.	Flexer ER FC tab 15 mg (Cyclobenzaprine) 服樂適 持續性釋放膜衣錠 15 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可磨粉。
93.	Fosamax plus * tab (Alendronate 70 mg+ Vit D3 2800 iu) 福善美 保骨錠	不可剝半或咀嚼，應配足量溫開水 (約 240 西西) 服用，服藥後 30 分鐘內勿進食或服用其他藥品，且服藥後 30 分鐘內避免躺下，以減少藥物對食道刺激。
94.	Fosamax PLUS * tab (Alendronate 70 mg+ Vit D3 5600 iu) 福善美 保骨錠	不可剝半或咀嚼，應配足量溫開水 (約 240 西西) 服用，服藥後 30 分鐘內勿進食或服用其他藥品，且服藥後 30 分鐘內避免躺下，以減少藥物對食道刺激。
95.	Fruzaqla cap 1 mg (Fruquintinib) 伏腸剋 膠囊 1 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
96.	Fylin retard FC * tab 400 mg (Pentoxifylline) 暢循 持續性膜衣錠 400 毫克 (配妥西菲林)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
97.	Galafold cap 123 mg (Migalastat) 加厲伏 膠囊 123 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊、壓碎或咀嚼。
98.	Gastro-Timelets cap 30 mg (Metoclopramide) 胃斯妥 持效膠囊 30 毫克 (美多普胺)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
99.	Giotrif FC tab 30 mg (Afinib) 妥復克 膜衣錠 30 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，請將本藥溶於冷開水，攪拌至錠劑崩散後服用。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
100.	Giotrif FC tab 40 mg (Afatinib) 妥復克 膜衣錠 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，請將本藥溶於冷開水，攪拌至錠劑崩散後服用。
101.	Glivec FC tab 100 mg (Imatinib) 基利克 膜衣錠 100 毫克	無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於冷開水後服用 (每錠溶於 50 西西)。
102.	Harnalidge D * tab 0.2 mg (Tamsulosin HCl) 活路利淨 持續釋放口溶錠 0.2 毫克	將本藥置於舌頭上，待完全溶解後再配適量溫開水吞服。本藥為持續釋放型，不可嚼碎。
103.	Harnalidge OCAS PR * tab 0.4 mg (Tamsulosin HCl) 活路利淨 持續性藥效膜衣錠 0.4 毫克	本藥為持續性膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
104.	Hiros S.R.M. cap (Cetirizine 5 mg + Pseudoephedrine 120 mg) 喜洛 緩釋微粒膠囊 (複方)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
105.	Ibrance cap 100 mg (Palbociclib) 愛乳適 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
106.	Ibrance cap 125 mg (Palbociclib) 愛乳適 膠囊 125 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
107.	Iclusig FC tab 15 mg (Ponatinib) 英可欣 膜衣錠 15 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
108.	Imbruvica # cap 140 mg (Ibrutinib) 億珂 膠囊 140 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
109.	Imdur CR tab 60 mg (Isosorbide-5-mononitrate) 寬心 持續性藥效錠 60 毫克 (單硝酸異山梨酯)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
110.	Immufine * cap 250 mg (Mycophenolate) 異莫分膠囊 250 毫克	本膠囊應整粒吞服，不可打開或嚼碎服用。
111.	Imuran tab 50 mg (Azathioprine) 移護寧 錠 50 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
112.	Inlyta FC tab 1 mg (Axitinib) 抑癌特 膜衣錠 1 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
113.	INLYTA FC * TAB 5 MG (AXITINIB) 抑癌特 膜衣錠 5 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
114.	Inrebic cap 100 mg (Fedratinib) 抑癌特 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
115.	Invega ER tab 3 mg (Paliperidone) 思維佳 持續性藥效錠 3 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
116.	Invega ER tab 6 mg (Paliperidone) 思維佳 持續性藥效錠 6 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
117.	Invega ER tab 9 mg (Paliperidone) 思維佳 持續性藥效錠 9 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
118.	Iressa FC tab 250 mg (Gefitinib) 艾瑞莎 膜衣錠 250 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於冷開水，攪拌至錠劑崩散後服用。
119.	Isoptin SR FC tab 240 mg (Verapamil) 心舒平 持續性膜衣錠 240 毫克 (汎泊密)	本藥為持續釋放型膜衣錠，可剝半但不可嚼碎。
120.	Jurnista PR #> tab 8 mg (Hydromorphone HCl) 釋通 緩釋錠 8 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
121.	Juxtapid * cap 5 mg (Lomitapide)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
122.	Juxtapid * cap 10 mg (Lomitapide)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
123.	Juxtapid * cap 20 mg (Lomitapide)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
124.	Jyseleca FC tab 200 mg (Filgotinib) 吉炎可 膜衣錠 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
125.	Kaletra FC * tab (Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg) 快利佳 錠劑 (複方)	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
126.	Keto EM cap 10 mg (Ketorolac) 克多炎 腸溶微粒膠囊 10 毫克 (三木甲胺克妥洛)	本藥為腸溶微粒膠囊，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
127.	Kisqali FC tab 200 mg (Ribociclib) 擊癌利 膜衣錠 200 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
128.	Klaricid XL tab 500 mg (Clarithromycin) 開羅理黴素 持續性藥效錠 500 毫克 (開羅理黴素)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
129.	Koselugo * cap 10 mg (Selumetinib) 科舒洛 膠囊 10 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
130.	Lacoxa SR * tab 400 mg (Etodolac) 樂夠效 緩釋錠 400 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
131.	Lafuzo XL PR * tab 10 mg (Alfuzosin) 列優治 持續性藥效錠 10 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
132.	Lazcluze FC # tab 80 mg (Lazertinib) 力安莎 膜衣錠 80 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
133.	Litfulo cap 50 mg (Ritlecitinib) 立服樂 膠囊 50 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊、壓碎或咀嚼。
134.	Livial tab 2.5 mg (Tibolone)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	利飛亞 錠 2.5 毫克	
135.	Lenvima cap 4 mg (Lenvatinib) 樂衛瑪 膠囊 4 毫克	本藥應整粒吞服，或將膠囊溶於一大匙水 10 分鐘後攪拌均勻服用。
136.	Lenvima cap 10 mg (Lenvatinib) 樂衛瑪 膠囊 10 毫克	本藥應整粒吞服，或將膠囊溶於一大匙水 10 分鐘後攪拌均勻服用。
137.	Lescol XL * tab 80 mg (Fluvastatin) 益脂可 長效緩釋膜衣錠 80 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可嚼碎。
138.	Lesiton cap 5 mg (Dihydroergotamine) 樂息痛 膠囊 5 毫克	本藥可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
139.	Leukeran tab 2 mg (Chlorambucil) 瘤克寧 錠 2 毫克 (氮芥苯丁酸)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
140.	Lipo-merz retard cap 500 mg (Etofibrate) 瀟血脂長效膠囊 500 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
141.	Lonsurf FC tab 15 mg (Trifluridine 15 mg + Tipiracil HCl 7.065 mg) 朗斯弗 膜衣錠 15 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑者，可將本藥溶於溫開水，攪拌至錠劑崩散後服用。
142.	Loxol SR * tab 75 mg (Ambroxol) 樂咳痰舒 長效錠 75 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
143.	LoraPseudo 24h SRFC * tab 10/240 mg (Loratadine 10 mg+Psuedoephedrine 240 mg) 莫鼻卡 24 小時持續性膜衣錠 (複方)	本藥為持續釋放型膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
144.	Lorviqua FC tab 25 mg (Lorlatinib) 瘤利剋 膜衣錠 25 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，請將本藥溶於冷開水，攪拌至錠劑崩散後立即服用。
145.	Lumakras FC tab 120 mg (Sotorasib) 洛滿舒 膜衣錠 120 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
146.	Lynparza FC tab 150 mg (Olaparib) 令癌莎 膜衣錠 150 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
147.	Madopar HBS cap "125" (L-dopa 100 mg + Benserazide 25 mg) 美道普 持續性藥效膠囊 100/25 毫克 (複方)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
148.	Meitifen SR FC tab 75 mg (Diclofenac) 麥得炎 緩釋膜衣錠 75 毫克 (待克菲那、二克氯吩)	本藥為持續釋放膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
149.	MetaCu * cap 200 mg (Trientine HCl) 解銅 膠囊 300 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
150.	Metalite * cap 250 mg (Trientine HCl)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
151.	Metalcaptase EC tab 300 mg (D-penicillamine) 滿克特 腸溶膜衣錠 300 毫克	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
152.	Methydur SR >* cap 33 mg (Methylphenidate HCl) 思有得 持續性藥效膠囊 33 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
153.	Mirapex PR * tab 0.375 mg (Pramipexole 2HCl) 樂伯克 持續性藥效錠 0.375 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
154.	Mirapex PR * tab 0.75 mg (Pramipexole 2HCl) 樂伯克 持續性藥效錠 0.75 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
155.	Mirapex PR * tab 1.5 mg (Pramipexole 2HCl) 樂伯克 持續性藥效錠 1.5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
156.	Mixre * cap 25 mg (Atomoxetine) 思敏 膠囊 25 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
157.	MIXRE * CAP 40 MG (ATOMOXETINE) 思敏 膠囊 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
158.	Mizollen FC * tab 10 mg (Mizolastine) 敏樂朗 膜衣錠 10 毫克	本藥為持續釋放型膜衣錠，可剝半但不可嚼碎。
159.	Molnupiravir cap 200 mg (40'S) (Molnupiravir)	本藥應整粒吞服。無法吞服膠囊的病人，可打開膠囊將內容物溶於水中，攪拌成懸浮液服用。
160.	Morphine SR FC tab 30 mg "NNB" (Morphine) 嗎啡 長效膜衣錠 30 毫克 (嗎啡)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
161.	MST continus tab 60 mg (Morphine) 嗎啡 長效膜衣錠 60 毫克 (嗎啡)	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
162.	Muaction SR #>* tab 100 mg (Tramadol) 妙而通 持續釋放錠 100 毫克 (特拉碼寶、妥美度)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
163.	Mucaine tab 胃卡因 錠 (複方)	本藥另含局部麻醉劑，故不可剝半或嚼碎，以免殘留口內會有麻木感。
164.	MXL #>* cap 60 mg (Morphine) 默痛舒持續性藥效膠囊 60 毫克 (嗎啡)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
165.	Myfortic tab 180 mg (Mycophenolic acid) 睦體康 腸衣錠 180 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
166.	Myleran tab 2 mg (Busulfan) 邁樂寧 錠 2 毫克 (二甲磺酸丁酯)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
167.	Napton SR tab 750 mg (Naproxen)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	拿百疼 長效持續緩釋錠 750 毫克 (那普洛辛、那普洛仙)	
168.	Natrilix SR FC tab 1.5 mg (Indapamide) 納催離 持續性藥效膜衣錠 1.5 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
169.	Navelbine soft #* cap 20 mg (Vinorelbine) 溫諾平 軟膠囊 20 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。請勿吞服破損之膠囊，如不慎咬破請以大量清水漱口。
170.	Navelbine soft #* cap 30 mg (Vinorelbine) 溫諾平 軟膠囊 30 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。請勿吞服破損之膠囊，如不慎咬破請以大量清水漱口。
171.	Nephoxil cap 500 mg (Ferric citrate 500 mg) 拿百磷 膠囊 500 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
172.	Nerlynx FC tab 40 mg (Neratinib) 賀儷安 膜衣錠 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
173.	Nexium tab 40 mg (Esomeprazole) 耐適恩 錠 40 毫克	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服或溶於適量冷開水後服用，不可嚼碎或磨碎。
174.	Nifecardia * SRFC tab 30 mg (Nifedipine) 冠脈循 持續性膜衣錠 30 毫克 (尼菲迪平)	本藥為持續釋放型膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎，錠劑殼可能隨糞便排出。
175.	Nifedipine "CYH" SRFC * tab 30 mg 恆脈循 持續性膜衣錠 30 毫克 (尼菲迪平)	本藥為持續釋放型膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎，錠劑殼可能隨糞便排出。
176.	Nilemdo FC tab 180 mg (Bempeidoic acid) 寧脂德 膜衣錠 180 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
177.	Ninlaro cap 4 mg (Ixazomib) 免瘤諾 膠囊 4 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
178.	Nitrostat tab 0.6 mg (Nitroglycerin) 耐絞寧 錠 0.6 毫克 (硝化甘油)	發生心絞痛徵兆時，舌下含 1 粒，若症狀未解除，可再每隔 5 分鐘含 1 粒，連服 3 次若仍疼痛，應立即就醫。
179.	Nubeqa FC tab 300 mg (Darolutamide) 諾博戈 膜衣錠 300 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
180.	Numient ER * cap 48.75mg/195mg (Carbidopa + Levodopa) 瑞多寧 緩釋膠囊 48.75 毫克/195 毫克 (複方)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
181.	Ofev soft cap 100 mg (Nintedanib) 抑肺纖 軟膠囊 100 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
182.	Ofev soft cap 150 mg (Nintedanib) 抑肺纖 軟膠囊 150 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
183.	Olumiant FC tab 4 mg (Baricitinib) 愛滅炎 膜衣錠 4 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服或溶於適量冷開水後服用，不可嚼碎。應避免直接接觸壓碎或破損錠

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
		劑。
184.	Olumiant (COVID) FC * tab 4 mg (Baricitinib) 愛滅炎 膜衣錠 4 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服或溶於適量冷開水後服用，不可嚼碎。應避免直接接觸壓碎或破損錠劑。
185.	Onbrez 150 ug/cap 30's & breezhaler (Indacaterol) 昂舒 吸入膠囊 150 微克	經口腔吸入用膠囊，切勿內服。
186.	Opsumit FC tab 10 mg (Macitentan) 傲朴舒 膜衣錠 10 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
187.	Otezla FC tab 30 mg (Apremilast) 歐泰樂 膜衣錠 30 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
188.	Oxbu ER * tab 5 mg (Oxybutynin Chloride) 歐舒 緩釋錠 5 毫克	本藥為持續釋放錠，可剝半但不可嚼碎。
189.	OxyContin CR #> tab 10 mg (Oxycodone HCl) 疼使康定 持續藥效錠 10 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
190.	OxyNorm IR #>* cap 5 mg (Oxycodone) HCl 奧諾美 膠囊 5 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
191.	Painkyl buccal soluble films 200 mcg (Fentanyl 0.31 mg/unit) 平舒疼 口頰溶片 200 微克	本藥為口頰溶片，應整片貼附於口腔內壁黏膜，不可咀嚼、吞服、切割或撕裂。
192.	Pantoloc tab 40 mg (Pantoprazole) 保衛康治潰樂 腸溶膜衣錠 40 毫克	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
193.	Pariet FC tab 20 mg (Rabeprazole) 百抑潰 膜衣錠 20 毫克	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
194.	Paxlovid FC tab 150mg/100mg(30'S(PF-07321332x20+Ritonavir)x10	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
195.	Paxlovid FC tab 150mg/100mg (20'S,eGFR 30-59)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
196.	PAXLOVID FC tab 150/100 mg (30'S) (Nirmatrelvir+Ritonavir) 倍拉維 膜衣錠 150/100 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
197.	Paxlovid tab "CDC" (eGFR<30,11tab)(Nirmatrelvir+Ritonavir)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
198.	Pemazyre tab 13.5 mg (Pemigatinib) 達伯坦 錠 13.5 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
199.	Pentasa PR granules 2 g (Mesalazine) 頗得斯安 持續性藥效顆粒劑 2 克	本藥為持續釋放型顆粒，將顆粒倒在舌頭上 (勿咀嚼)，配足量溫水或果汁吞服。
200.	Pentasa PR tab 500 mg (Mesalazine) 頗得斯安 持續性藥效錠 500 毫克	本藥為持續釋放型，不可嚼碎，可剝半或泡在水中或果汁中立即服用。
201.	Phyllocontin CR tab 225 mg (Aminophylline) 菲康汀 持續性藥效錠 225 毫克 (胺非林)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
202.	Piqray FC tab 150 mg (Alpelisib) 愛克利 膜衣錠 150 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
203.	Plendil ER * tab 2.5 mg (Felodipine) 普心寧 持續性藥效錠 2.5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
204.	Plendil ER * tab 5 mg (Felodipine) 普心寧 持續性藥效錠 5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
205.	Pomalyst # cap 4 mg (Pomalidomide) 鉑美特 膠囊 4 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
206.	Posanol * tab 100 mg (Posaconazole) 波賽特 錠劑 100 毫克	本藥為腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
207.	Pradaxa cap 75 mg (Dabigatran etexilate) 普栓達 膠囊 75 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
208.	Pradaxa cap 110 mg (Dabigatran etexilate) 普栓達 膠囊 110 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
209.	Pradaxa cap 150 mg (Dabigatran etexilate) 普栓達 膠囊 150 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
210.	Prevymis FC tab 30 mg (Letermovir) 滅巨斯 膜衣錠 240 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
211.	Priligy FC tab 30 mg (Dapoxetine) 必利勁 膜衣錠 30 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
212.	Progor cap 120 mg (Diltiazem HCl) 保樂康 緩釋膠囊 120 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
213.	Protase EC cap 280 mg (Pancrelipase) 優妙化 腸溶微粒膠囊 280 毫克	本藥為腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
214.	Qinlock tab 50 mg (Ripretinib) 期樂 錠 50 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
215.	Qtern FC # tab 5 mg/10 mg	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	控糖穩 膜衣錠 5/10 毫克	
216.	Rancad ER tab 500 mg (Ranolazine) 諾瑞心寧 持續性藥效錠 500 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
217.	Raxone FC tab 150 mg (Idebenone) (180'S)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
218.	Rebetol cap 200 mg (Ribavirin) 瑞比達 膠囊 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
219.	Regrow SR FC tab 60 mg (Dextromethorphan) 愛舒可羅 持續性膜衣錠 60 毫克 (右旋美索芬)	本藥為持續釋放型膜衣錠，可剝半但不可嚼碎。
220.	Relenza rotadisk 5 mg 20's & diskhaler "CDC" (Zanamivir) 瑞樂沙 旋達碟 5 毫克	四粒裝藥囊為口腔吸入用，切勿內服。藥囊未放置吸入器或未立即吸入藥劑之前，請勿刺破藥囊。
221.	Remeron soltab 30 mg (Mirtazapine) 樂活憂 口溶錠 30 毫克	將本藥置於舌頭上 (勿咀嚼)，待完全溶解後再配適量溫開水吞服。
222.	Reminyl PR * cap 16 mg (Galantamine) 利憶靈 持續性藥效膠囊 16 毫克	本藥為持續釋放劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
223.	Requip PD PR * tab 2 mg (Ropinirole) 力必平 持續性藥效膜衣錠 2 毫克	本藥為持續釋放劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
224.	Requip PD PR * tab 8 mg (Ropinirole) 力必平 持續性藥效膜衣錠 8 毫克	本藥為持續釋放劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
225.	Retsevmo hard cap 80 mg (Selpercatinib) 銳癌寧 膠囊 80 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
226.	Revlimid # * cap 10 mg (Lenalidomide) 瑞復美 膠囊 10 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
227.	Revlimid cap 25 mg (Lenalidomide) 瑞復美 膠囊 25 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
228.	Ribarin * cap 200 mg (Ribavirin) 摩舒肝清 膠囊 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
229.	Rinvoq ER tab 15 mg (Upadacitinib) 銳虎 持續性藥效錠 15 毫克	本藥為持續釋放劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
230.	RINVOQ ER * TAB 45 MG (Upadacitinib) 銳虎 持續性藥效錠 45 毫克	本藥為持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
231.	RITALIN LA >* CAP 20 MG (METHYLPHENIDATE HCl) 利長能 持續性藥效膠囊 40 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
232.	Robotrol cap 200 mg (Ribavirin) 羅拔除 膠囊 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
233.	Roxane cap 75 mg (Roxatidine) 樂胃聖 膠囊 75 毫克	本藥為長效劑型，可打開膠囊，不可嚼碎。
234.	Rozlytrek hard cap 200 mg (Entrectinib) 羅思克 膠囊 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
235.	Rozlytrek "X" hard cap 200 mg (Entrectinib)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
236.	Rybelsus tab 14 mg (Semaglutide) 瑞倍適 錠 14 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或嚼碎。
237.	Rydapt soft cap 25 mg (Midostaurin) 療德妥 軟膠囊 25 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
238.	Rytmonorm tab 150 mg (Propafenone) 心利正 膜衣錠 150 毫克 (普帕酚酮)	本藥應整粒吞服，不可嚼碎。
239.	Rytmonorm tab 300 mg (Propafenone) 心利正 膜衣錠 300 毫克 (普帕酚酮)	本藥應整粒吞服，不可嚼碎。
240.	Salazopyrin EN tab 0.5 g (Sulfasalazine) 斯樂 腸溶錠 0.5 公克	本藥為腸溶錠，可剝半但不可嚼碎。
241.	Salazine EC * tab 500 mg (Sulfasalazine) 撒樂 腸溶錠 500 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
242.	Salcoat cap for spray 0.05 mg (Beclomethasone) 賜爾克痛 口腔噴霧用膠囊 0.05 毫克 (貝可每松)	口腔噴霧用膠囊，切勿內服。
243.	Seglor cap 5 mg (Dihydroergotamine) 塞戈羅 膠囊 5 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎。
244.	Selpercatinib hard * cap 40 mg	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
245.	SELPERCATINIB HARD * CAP 80 MG	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
246.	Selumetinib * cap 10 mg	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
247.	Selumetinib cap 25 mg	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
248.	Seroquel XR ER * tab 50 mg (Quetiapine) 思樂康 持續性藥效錠 50 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
249.	Seroquel XR ER * tab 200 mg (Quetiapine) 思樂康 持續性藥效錠 200 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
250.	Seroquel XR ER * tab 300 mg (Quetiapine) 思樂康 持續性藥效錠 300 毫克	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
251.	Seroxat CR * tab 12.5 mg (Paroxetine) 克憂果 持續性藥效錠 12.5 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
252.	Slow-K tab 600 mg (Potassium chloride-SR, KCl) 緩釋鉀 錠 600 毫克 (氯化鉀)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
253.	Sotyktu FC tab 6 mg (Deucravacitinib) 舒停復 膜衣錠 6 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
254.	Sprycel FC #* tab 20 mg (Dasatinib) 柏萊 膜衣錠 20 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
255.	Sprycel FC #* tab 50 mg (Dasatinib) 柏萊 膜衣錠 50 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
256.	Stalevo FC tab 100/25/200 mg (Levodopa/Carbidopa/Entacapone) 始立 膜衣錠 100/25/200 毫克 (複方)	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
257.	Stilnox CR * tab 6.25 mg (Zolpidem tartrate) 使蒂諾斯 長效錠 6.25 毫克	本藥為持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
258.	Stivarga FC tab 40 mg (Regorafenib) 癌瑞格 膜衣錠 40 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
259.	Strattera hard * cap 25 mg (Atomoxetine) 思銳 膠囊 25 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。若眼睛不慎接觸膠囊中粉末，請立即以清水沖洗。
260.	Strattera hard * cap 40 mg (Atomoxetine) 思銳 膠囊 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。若眼睛不慎接觸膠囊中粉末，請立即以清水沖洗。
261.	Strocain tab (Oxethazaine 5 mg + Polymigel 244 mg) 息痛佳音 錠 (複方)	本藥另含局部麻醉劑，故不可剝半或嚼碎，以免殘留口內會有麻木感。
262.	Syprine cap 250 mg (Trientine HCl)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
263.	Tabrecta FC tab 200 mg (Capmatinib) 泰芮塔 膜衣錠 200 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
264.	Takepron OD * tab 30 mg (Lansoprazole) 泰克胃通 口溶錠 30 毫克	將本藥置於舌頭上，可立即溶解直接吞服，或配適量溫開水吞服。本藥為腸溶微粒口溶錠，可剝半但不可嚼碎。
265.	Talzenna cap 0.25 mg (Talazoparib) 達勝癌 膠囊 0.25 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎、溶解。
266.	Tamos #* cap 100 mg (Temozolomide) 特莫斯 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
267.	Tanleeg FC * tab 500 mg (Nabumetone) 疼立解 膜衣錠 500 毫克 (奈布救痛)	本藥為膜衣錠，可剝半但不可嚼碎。
268.	Tagrisso FC tab 80 mg (Osimertinib) 泰格莎 膜衣錠 80 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。 無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於冷開水，攪拌至錠劑崩散後服用。
269.	Tasigna cap 150 mg	本藥應整粒吞服。無法吞服膠囊的病人，可打開

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	泰息安 膠囊 150 毫克	膠囊將內容物溶於蘋果泥後服用。
270.	Tasigna cap 200 mg 泰息安 膠囊 200 毫克	本藥應整粒吞服。無法吞服膠囊的病人，可打開膠囊將內容物溶於蘋果泥後服用。
271.	Tecfidera gastro-resistant hard cap 240 mg (Dimethyl fumarate) 泰福德 腸溶微粒膠囊 240 毫克	本藥為腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
272.	Tegretol CR.FC tab 200 mg (Carbamazepine) 癲通 長效膜衣錠 200 毫克 (卡巴氮平)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
273.	Temgesic #> sublingual tab 0.2 mg (Buprenorphine) 丁基原啡因 舌下錠 0.2 毫克 (丁基原啡因)	舌下含片，不可剝半或嚼碎。
274.	Temodal #* cap 20 mg (Temozolomide) 帝盟多 膠囊 20 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
275.	Temodal #* cap 100 mg (Temozolomide) 帝盟多 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
276.	Tepmetko FC tab 225 mg (Tepotinib) 德邁特 膜衣錠 225 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於 30 毫升冷開水，攪拌至錠劑崩散後服用。
277.	Tepotinib FC tab 225 mg (Tepotinib HCl hydrate 250 mg)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
278.	Throne Enteric SC * tab 100 mg (Pentoxifylline) 克栓 腸溶錠 100 毫克	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
279.	Tibsovo tab 250 mg (Ivosidenib)	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
280.	Tramal retard #>* tab 100 mg (Tramadol) 舒敏 長效錠劑 100 毫克 (特拉碼寶)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
281.	Trenfylline SRFC * tab 400 mg (Pentoxifylline) 循血敏 持續性膜衣錠 400 毫克 (配妥西菲林)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
282.	Trental * tab 400 mg (Pentoxifylline) 循能泰 持續性糖衣錠 400 毫克 (配妥西菲林)	本藥為持續釋放型，可剝半但不可嚼碎。
283.	Trientine HCl cap 300 mg (Trientine HCl)	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
284.	Trilipix MR cap 135 mg (Choline fenofibrate) 利落脂寧 緩釋膠囊 135 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
285.	Trokendi XR ER * cap 50 mg (Topiramate) 妥偏停 持續性釋放膠囊 50 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
286.	TROKENDI XR ER * cap 100 MG (Topiramate) 妥偏停 持續性釋放膠囊 100 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
287.	Trokendi XR ER * cap 200 mg (Topiramate) 妥偏停 持續性釋放膠囊 200 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
288.	Uptravi FC tab 200 mcg (Selexipag) 尚達利 膜衣錠 200 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
289.	Uptravi FC tab 600 mcg (Selexipag) 尚達利 膜衣錠 600 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
290.	Uptravi FC tab 800 mcg (Selexipag) 尚達利 膜衣錠 800 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
291.	Uptravi (CM) FC * tab 200 mcg (Selexipag) 優拓比 膜衣錠 200 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
292.	Uptravi (CM) FC * tab 600 MCG (Selexipag) 優拓比 膜衣錠 600 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
293.	UPTRAVI (CM) FC * TAB 800 MCG (SELEXIPAG) 優拓比 膜衣錠 800 微克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
294.	Vafseo tab 300 mg (Vadadustat) 衛復守 錠劑 300 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
295.	Valosine SR cap 75 mg (Venlafaxine) 煩清 持續性藥效膠囊 75 毫克	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
296.	Verelan SR cap 120 mg (Verapamil) 維爾寧 持續性膠囊 120 毫克 (汎泊密)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
297.	Verzenio FC * tab 100 mg (Abemaciclib) 捷癌寧 膜衣錠 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於至少 10 毫升冷開水，攪拌至錠劑崩散後立即服用。
298.	Verzenio FC tab 150 mg (Abemaciclib) 捷癌寧 膜衣錠 150 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。無法吞服錠劑的病人，可將本藥溶於至少 10 毫升冷開水，攪拌至錠劑崩散後立即服用。
299.	Viagra OD * tab 50 mg (Sildenafil) 威而鋼 口溶錠 50 毫克	將本藥置於舌頭上 (勿咀嚼)，待完全溶解後再配適量溫開水吞服。
300.	Videx EC cap 250 mg (Didanosine) 惠妥滋 持續性藥效膠囊 250 毫克	本藥為腸溶膜衣持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
301.	Videx EC cap 400 mg (Didanosine) 妥滋 持續性藥效膠囊 400 毫克	本藥為腸溶膜衣持續釋放型，應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
302.	Viramune XR ER * tab 400 mg (Nevirapine) 衛滋 持續性藥效錠 400 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
303.	Vitrakvi cap 100 mg (Larotrectinib) 維泰凱 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
304.	Volibris FC tab 10 mg (Ambrisentan) 肺博舒 膜衣錠 10 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
305.	Voren EM cap 50 mg (Diclofenac) 非炎 腸溶微粒膠囊 50 毫克 (二克氯吩)	本藥為腸溶微粒劑型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
306.	Votan SR FC tab 100 mg (Diclofenac sodium) 莫痛 緩釋膜衣錠 100 毫克 (待克菲鈉)	本藥為緩釋膜衣劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
307.	Votrient FC tab 200 mg (Pazopanib) 福退癌 膜衣錠 200 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
308.	Votubia tab 2.5 mg (Everolimus) 癌伏妥 錠 2.5 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
309.	Vyndamax soft cap 61 mg (Tafamidis) 維萬心 軟膠囊 61 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
310.	Vyndaqel cap 20 mg (Tafamidis)	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
311.	Wellbutrin SR tab 150 mg (Bupropion) 威博雋 持續藥效錠 150 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
312.	Wellbutrin XL * tab 300 mg (Bupropion HCl) 威克倦 持續性藥效錠 300 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
313.	Xalkori cap 250 mg (Crizotinib) 截剋瘤 膠囊 250 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
314.	Xanax XR ER * tab 0.5 mg (Alprazolam) 贊安諾 持續性藥效錠 0.5 毫克 (阿普唑他、三氮二氮平)	本藥為持續釋放錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
315.	Xanthium * cap 200 mg (Theophylline) 善寧持續性藥效膠囊 200 毫克 (茶鹼)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
316.	Xanthium cap 400 mg (Theophylline) 善寧持續性藥效膠囊 400 毫克 (茶鹼)	本藥為持續釋放型，可打開膠囊，但不可嚼碎顆粒。
317.	Xatral XL * tab 10 mg (Alfuzosin) 札特 持續性藥效錠 10 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
318.	Xeljanz XR ER tab 11 mg (Tofacitinib) 捷抑炎 持續性藥效錠 11 毫克	本藥為持續釋放型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
319.	Xospata FC tab 40 mg (Gilteritinib) 適加坦 膜衣錠 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
320.	Xtandi FC tab 40 mg (Enzalutamide) 安可坦 膜衣錠 40 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
321.	Xtandi soft cap 40 mg (Enzalutamide)	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼

項次	商品名 劑型 含量 (學名)	給藥說明
	安可坦 軟膠囊 40 毫克	碎。
322.	Zavedos # cap 5 mg (Idarubicin HCl) 艾達黴素 膠囊 5 毫克	請直接由裝藥瓶將本藥送入口中，避免以手接觸膠囊。本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。請勿吞服破損之膠囊，若眼睛、皮膚、口腔或黏膜不慎接觸膠囊中粉末，請以大量清水沖洗該部位。
323.	Zcough soft cap 100 mg (Benzonatate) 咳治得 軟膠囊 100 毫克	本藥為軟膠囊劑型，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
324.	Zejula cap 100 mg (Niraparib) 截永樂 膠囊 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
325.	Zejula tab 100 mg (Niraparib) 截永樂 錠 100 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半、壓碎或咀嚼。
326.	Zelboraf FC tab 240 mg (vemurafenib) 日沛樂 膜衣錠 240 毫克	本藥為膜衣錠，應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。
327.	Zeposia cap 0.92 mg (Ozanimod) 捷保舒 膠囊 0.92 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
328.	Zykadia cap 150 mg (Ceritinib) 力克癌 膠囊 150 毫克	本藥應整粒吞服，不可打開膠囊或嚼碎。
329.	Zyprexa Zydis OD * tab 5 mg (Olanzapine micronized) 津普速 口溶錠 5 毫克	將本藥置於舌頭上 (勿咀嚼)，待完全溶解後再配適量溫開水吞服。
330.	Zyprexa Zydis OD * tab 10 mg (Olanzapine micronized) 津普速 口溶錠 10 毫克	將本藥置於舌頭上 (勿咀嚼)，待完全溶解後再配適量溫開水吞服。
331.	Zytiga tab 250 mg (Abiraterone acetate) 澤珂 錠 250 毫克	本藥應整粒吞服，不可剝半或嚼碎。