





認識 日本腦炎、 登革熱



台北榮總兒科門診

日本腦炎




傳染窩

以豬、鳥類為主



傳播媒介 具有感染力病媒蚊叮咬

三斑家蚊
環紋家蚊
白頭家蚊



傳染方式

不會由人直接傳染給人

未帶病毒的蚊子



叮咬於病毒血症的動物(如:豬)




病媒蚊



叮咬人



發病



臨床症狀





- 大部分無明顯症狀。
- < 1% 有症狀者會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀。
- 嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等。

預防方法

- 依規定時程接種日本腦炎疫苗
(出生滿15個月及2歲3個月；第一劑與第二劑之間間隔一年)。
- 避免於黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。

登革熱



傳染窩

人類
靈長類
斑蚊



傳播媒介

具有感染力病媒蚊叮咬

埃及斑蚊
白線斑蚊



傳染方式

不會由人直接傳染給人

蚊子



叮咬於病毒血症的人、靈長類




病媒蚊



叮咬人、靈長類



發病



臨床症狀



- 突發性的高燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)，頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等。
- 要觀察是否出現登革熱重症:腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、嗜睡及躁動不安、黏膜出血、嚴重器官損傷或出血。

預防方法

- 出國要防蚊，穿著長袖衣褲、使用政府核可之防蚊液。
- 回國後，有症狀速就醫並告知旅遊史。
- 發病期間要掛上蚊帳並待在蚊帳內或室內，避免蚊子叮咬造成更進一步傳染。



登革熱、日本腦炎 超級比一比



衛生福利部疾病管制署廣
TAIWAN CDC 告

	登革熱	日本腦炎
病媒蚊	埃及斑蚊、白線斑蚊 	三斑家蚊、環紋家蚊、 白頭家蚊 
預防方式	巡、倒、輕、刷， 清除孳生源	接種日本腦炎疫苗
防蚊措施	流行期作好自我保護措施，可穿著淺色長袖衣褲， 身體裸露處使用政府主管機關核可含DEET、 Picaridin或IR3535之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。 	

注意：防蚊藥劑使用前，要先確認產品標示及使用範圍、方法、用量，以及適合的使用對象年齡

落實「巡、倒、清、刷」 防治病媒蚊孳生！



巡：巡視家內外積水容器

倒：倒掉容器內積水並倒蓋



清：清除多餘容器並回收



刷：刷洗容器避免蟲卵孳生




斷絕病媒蚊繁殖機會，住家應裝置紗門、紗窗。

建議使用經政府主管
機關核可含有
敵避（DEET）、派卡
瑞丁（Picaridin）或
伊默克（IR3535）成分
的防蚊藥劑，並依照
標籤指示說明使用



防蚊液這樣選 登革熱難靠近



成分	Diethyltoluamide 待乙妥、 DEET 敵避	Picaridin 派卡瑞丁	IR3535 伊默克
適用 年齡	2個月 以上 	2歲 以上 	2歲 以上 
濃度 建議	成人 ≤ 50% 嬰兒 10%-30% (嬰兒回到室內後要清洗)	孩童 < 15%	孩童 < 15%
使用 說明	1. 購買或使用前記得確認產品是否可噴灑於皮膚 2. 使用時應避免沾到眼、鼻等黏膜部位 3. 孩童皮膚較敏感，應距離皮膚 10-15cm 噴灑 4. 同時使用防曬及防蚊產品時，擦防曬後間隔 15 分鐘再使用防蚊劑		



流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，建議可以補擦喔！

登革熱防疫如作戰

巡



定期巡檢，避免室內外容器積水

倒



倒除積水，將積水容器倒置

清



環境整理，清理不用的容器並予以回收

刷



定期刷洗容器內側邊壁，避免蚊卵附著

容易忽略的孳生源

花盆底盤



戶外花盆底盤積水



戶外盆栽底盤以不使用為原則，或定期檢查清理刷洗

三角錐輪胎



輪胎內部積水



輪胎打洞使內部積水流出現，或是避免使用輪胎

澆花種菜儲水容器



儲水容器成為積水容器



不用時將容器倒置，或加裝紗網、加蓋，避免病媒蚊飛入產卵

屋簷的排水槽(天溝)



屋簷的排水槽年久淤積堵塞，容易產生積水




定期清理阻塞的天溝，保持暢通、避免積水

備註：經常巡檢室內花器和積水容器：遇有下雨，應加強戶外積水容器清理。

臺北市政府環境保護局 廣告

天氣炎熱蚊蟲多 遠離登革熱



衛生福利部疾病管制署 廣
TAIWAN CDC 告

NO! 不讓蚊生



巡視花器、水溝



澈底清潔
戶內外容器



刷除蟲卵
容器要收好



倒除
積水容器



容器倒蓋



NO! 不讓蚊叮



儘量避免在
戶外樹蔭逗留



穿著淺色
的長袖衣褲



使用核准
含有DEET
防蚊液


NO! 不讓蚊進






蚊香驅蚊
或噴灑殺蟲劑



家中設置
紗窗、紗門




有獎徵答




如何預防登革熱？

積極清除積水容器
加強自身的防蚊措施



日本腦炎傳染窩是？

以豬及鳥類為主



THANK
YOU!

