

麻疹

台北榮總兒科門診

傳染窩

人為唯一之宿主與傳染窩

潛伏期

以出疹日為計算基準，
自感染至出疹約7-18天，
平均14天左右。

傳染方式

空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而被感染。

傳染期

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力。
若沒出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期。

常見症狀

發燒



咳嗽



鼻炎




結膜炎



出紅疹



發燒3~4天後口腔內出現斑點(柯式斑點)



常見症狀

耳後→臉→軀幹→四肢→全身冒紅疹



嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

預防方式



1. 常規公費疫苗接種：

- 出生**滿12個月**，及**滿5歲**至入國小前各接種一劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」。
- 本國籍**育齡**婦女，檢具近**3個月內**之德國麻疹抗體檢驗陰性報告者，提供1劑；產後補種，若於懷孕期間經檢測未具德國麻疹抗體，於產後持該胎次檢驗日**起之2年內**德國麻疹抗體檢驗報告者，提供1劑。

(育齡婦女:15歲至49歲)

預防方式

- 外籍配偶**育齡**婦女：針對來臺首次申請居留或定居時，若無德國麻疹相關疫苗接種證明或經檢測為德國麻疹抗體陰性者，提供1劑。若其後經檢測德國麻疹抗體仍為陰性並出具**3個月內**之檢驗證明者，可再提供1劑。

2.自費疫苗接種：建議



預防方式

3.出入公共場所配戴口罩。



4.勤洗手。



接種
疫苗

「麻」

煩不來找


measles

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC 告



常見症狀
發高燒、鼻炎、紅疹
結膜炎、咳嗽

接種疫苗
有效預防麻疹



媽 Mom~Mom~Rrr~
MMR混合疫苗 = [麻疹+腮腺炎+德國麻疹] 混合疫苗

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

小叮嚀

還沒接種的幼兒要
避免前往麻疹疫區
才不會被傳染喔！

人家還沒打MMR疫苗
媽媽不准我出國玩~QQ



自費疫苗

計畫前往有麻疹疫情地區者：

- 1. 出生滿6個月至未滿1歲幼兒：**於出國前評估接種需求，可自費接種1劑。滿1歲後仍須按時程完成2劑公費接種（與前一劑至少間隔4週）。
- 2. 1981年（含）以後出生的成人，**建議自費接種1劑後再行前往。

有獎徵答

麻疹的預防方式？

施打疫苗、戴口罩、勤洗手



**THANK
YOU**