


認識腺病毒

台北榮總關心您~~


腺病毒

- ▶ 腺病毒是一種常見的病毒感染
- ▶ 四季都可能發生
- ▶ 出現在不同部位或器官引發各類症狀
- ▶ 以不同的臨床表徵出現
- ▶ 高度傳染性
- ▶ 伴隨著咽炎和發燒的上呼吸道感染
- ▶ 造成孩童腹瀉的腸胃道感染
- ▶ 眼睛的急性黏膜感染
- ▶ 局部摸到淋巴結





咽炎



膿泡扁桃腺炎




濾泡性的結膜炎



皮膚疹子



紅眼症



紅眼症

腺病毒流行病學

- ▶ 潛伏期為5~12天(平均8天)，
- ▶ 傳染途徑主要是透過飛沫傳染，少部分由糞便接觸感染
- ▶ 容易侵犯六個月至五歲小孩

腺病毒診斷

- ▶ 以臨床症候來作為診斷
- ▶ 取被感染者黏膜分泌物
- ▶ 電子顯微鏡檢查
- ▶ 做病毒培養
- ▶ 抽血看血清抗體是否有上升



腺病毒預防方法



- ▶ 目前沒有疫苗可預防
- ▶ 請盡量到空曠通風的環境，避免出入密閉式公共場所如電影院、超市、百貨公司
- ▶ 在家隔離休息暫勿上課、補充水分
- ▶ 保持居家環境清潔
- ▶ 加強個人生活習慣，例如（勤洗手、戴口罩、帶手帕、勿揉眼、不熬夜、適度運動）



腺病毒治療




- ▶ 目前並無有效的抗病毒藥物
- ▶ 臨床治療採用「**症狀治療**」
- ▶ 使用退燒藥、化痰藥、鼻塞藥減輕症狀
- ▶ 結膜炎可使用含類固醇的眼藥水
- ▶ 腹瀉腸胃炎採清淡飲食配合止瀉藥物
- ▶ 咽峽炎採溫冷軟食配合消腫止痛藥物

腺病毒治療



- ▶ 家長應觀察病童在發燒頻率、間隔多久又燒
- ▶ 活動力、精神狀況、嗜睡、胸悶、呼吸不順

發燒的時間	溫度	間隔多久	處理	退燒時間
09:00	39 °C		馬蓋仙	10:30
11:30	38.6 °C	2.5HR	洗澡 +SCANOL	13:30
18:30	39 °C	6HR	馬蓋仙	19:30



Q&A

▶ 腺病毒好發季節?

	流感	腺病毒
病毒類型	RNA	DNA
傳染途徑	飛沫	飛沫、糞口
好發年齡	不分年紀	六個月至五歲小孩
好發季節	10月-隔年3月	四季
季節差異性	無	在冬、春的冷季節中以「呼吸道」為多；春、初夏的「熱季節」則以合併結膜炎為多。
潛伏期	1-4天(2天)	5-12天(平均8天)
症狀	發燒、咳嗽、 全身痠痛	高燒、咳嗽、流鼻水、咽炎、咽痛為主 。在咽喉炎常發現有膿泡，尤其是二歲以下的幼兒易有「膿泡扁桃腺炎」「咽結膜炎熱」；在眼睛的部分可看到濾泡性的結膜炎(俗稱紅眼症)，常是單側，會流淚、燒灼感、結膜充血；喉炎氣管炎，或是哮吼病；腹痛、嘔吐、頭痛、腹瀉的胃腸炎為主；皮膚疹子；急性出血性膀胱炎；心肌炎、心包膜炎；無菌性腦膜炎，
併發症	肺炎、鼻竇炎、 支氣管炎	肺炎、支氣管炎、腦炎

謝
謝
聆
聽
!!!