

麻疹

麻疹

1. 麻疹致病原：麻疹病毒
2. 傳染窩：人為唯一之宿主與傳染窩
3. 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天。

4. 麻疹傳染方式：

- * 麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，經由**空氣、飛沫**傳播或**接觸**病人**鼻咽分泌物**而感染。
- * 在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。

5. 常見症狀有：

發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3~4天後口腔內出現斑點（**柯式斑點**），嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

6. 治療方法與就醫資訊：

麻疹的治療為支持療法以及避免併發症的發生。

7. 預防方法：接種疫苗

- ① 常規疫苗接種：出生滿12個月，及滿5歲至入國小前各接種一劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」。
- ② 自費疫苗接種：建議

麻疹

下列有較高麻疹感染風險者：

(一) 計畫前往有麻疹疫情地區者：

(1) 出生滿6個月至未滿1歲幼兒：於出國前評估接種需求，自費接種1劑，滿12個月後仍須按時程完成2劑公費接種（與前一劑至少間隔4週）。

(2) 1981年（含）以後出生的成人，建議自費接種1劑後再行前往。

麻疹

(二)工作性質會頻繁接觸外國人者：

1981年（含）以後出生者，建議
自費接種1劑。

(三)無疫苗接種紀錄或是麻疹/德國麻疹抗體陰性證明之育齡婦女，應
接種2劑

（德國麻疹抗體陰性者公費補助一劑）。

考考你~~~

1. (○) 麻疹的傳染方式是經由空氣飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染？
2. (○) 人類是唯一麻疹病毒之宿主及傳染窩？
3. (○) 麻疹的前驅臨床症狀有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽以及發燒3-4天後口腔內出現柯氏斑點。
4. (X) 麻疹的潛伏期是以出疹日為計算基準，自感染至出疹約6天。
5. (X) 若有計畫前往麻疹疫情疫區，1981年以後出生者建議自費接種2劑疫苗再行前往。

~~~儘管考