

Dermatix® 倍舒痕凝膠

適用於已癒合的傷口和舊疤痕。

建議**持續使用3-6個月**以預防疤痕產生。

治療時間長短取決於疤痕狀況，且因人而異。

每日2次，擦拭薄薄1層。



衛署醫器輸壹字第009063號

原理

倍舒痕®凝膠可於傷口表面形成一層保護膜，能保濕皮膚，**軟化疤痕**。



使用時機

- 適用於各種手術後、外傷縫合、燒燙傷、蟹足腫、肥厚性、剖腹產等疤痕。
- 特別適合不規則的肌膚 / 疤痕表面，關節、彎曲部位與臉部使用。



⚠ 僅限於外用，使用時請避免直接接觸眼睛、口內、第三度燒傷及未癒合的傷口。若有任何問題，建議請先詢問醫生。

使用方法

步驟1

使用倍舒痕凝膠在**已經癒合的傷口**上，通常用於手術或受傷後 10-14 天，就可以開始使用。使用前，先用肥皂及清水**潔淨患處**，待乾後便可塗上。




使用方法

步驟2

用適量的倍舒痕凝膠，順著疤痕薄薄塗開，塗抹時將凝膠同方向推展；勿來回塗抹約1/2米粒大小，可使用於長7~10公分，寬0.5公分的疤痕。



使用方法



步驟3

待1-2分鐘，讓皮膚乾燥後，
就可穿上衣服或上妝。

如果等待時間過長，不易乾燥
表示用量太多。將過厚的部分
擦掉即可，下次用量就要減少！

塗抹在15公分疤痕換算
7g約可使用1個月

