

乳房切除後外觀重建方式比較




彭成康醫師 吳思賢醫師 蕭福尹醫師 連珮如護理師 編修 105.10

義乳墊胸

義乳植入

自體組織

游離腹部皮瓣



手術方式	不需額外手術 依大小、形狀放置矽膠墊胸於內衣裡	兩階段手術 第一次植入組織擴張器，經過三到六個月擴張，再置換成鹽水袋或矽膠義乳	將下腹的皮膚及脂肪組織連帶血管利用顯微血管手術轉移至前胸
住院天數	不需額外住院	第一階段：1-2天 第二階段：1-2天	7-10天
恢復期	不需額外恢復期	1-2週	6-8週
傷口	乳房切除傷口	乳房切除傷口	乳房切除傷口 下腹部傷口
外觀	前胸平坦無乳房突起	較挺， 穿著內衣時外觀對稱 觸感隨時間會較硬	外觀自然下垂 觸感自然且柔軟
感覺		因乳房切除會缺乏感覺	
後遺症	接觸性皮膚過敏	義乳位移，破裂， 莢膜攣縮，感染，皺摺， 植入物相關長期後遺症	部分脂肪壞死 (3-13%) 部分皮瓣壞死 (1-2%) 腹部疝氣，無力等 (1%) 皮瓣血管栓塞壞死 (1%)
優點	不需另外手術	手術及恢復時間短 無另外傷口	觸感及外觀自然 可同時緊實腹部
缺點	不服貼、不自然 夏天易悶熱 穿衣時較麻煩 前胸平坦無乳房突起	沒有自然乳房質地 外觀挺，無自然下垂 觸感隨時間會變硬 可能有長期後遺症	腹部有額外傷口 手術及麻醉時間長 恢復時間長 腹部無力或疝氣
適合狀況	不想接受額外手術 希望先治療癌症 需要時間考慮重建手術	需快速恢復工作 沒有足夠自體組織 對側想同時隆乳 不適合長時間麻醉 之後有懷孕的計畫	擔心植入物後遺症 想要有自然外觀
花費	\$	\$\$	\$\$\$

